

DEADYNA®**INSETTICIDA LIQUIDO PIRETROIDE IN MICROEMULSIONE ACQUOSA
PER USO DOMESTICO E CIVILE****DEADYNA®****Composizione**

100 grammi di prodotto contengono
 Cipermetrina pura (cis/trans 40/60) 6,85 g (69,2 g/l) (tecnica 7,61 g)
 Tetrametrina pura 1,25 g (12,6 g/l) (tecnica 1,36 g)
 Coformulanti q.b. a 100 g

Contiene: Tetrametrina; Dodecil benzen solfonato di calcio, lineare

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro. H318 Provoca gravi lesioni oculari.
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280 Indossare guanti impermeabili resistenti ai prodotti chimici (EN 374) / indumenti protettivi (camici protettivi) / proteggere gli occhi usando occhiali protettivi con protezione laterale (EN166) / il viso / proteggere adeguatamente le vie respiratorie (maschera con filtro tipo A). P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Titolare della Registrazione

BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Tel 0543 754430 - Fax 0543 754162

Distribuito da ITAL-AGRO S.r.l. Salerano sul Lambro (LO)

Officine di Produzione SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 – 20094 Corsico (MI)

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 17674

Contenuto netto: ml 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 1000
 litri 5 - 10 - 20 - 25 per uso professionale

Partita n.del.....
 Validità: 2 anni

**PERICOLO**

Norme precauzionali Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente - Nel caso di trattamenti in ambienti zootecnici allontanare gli animali durante il trattamento – **Non impiegare in agricoltura.**

Informazioni per il medico Azione farmacodinamica del p.a.: blocco della trasmissione nervosa. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli**

CARATTERISTICHE

DEADYNA® è un formulato in microemulsione acquosa contenente l'associazione di due piretroidi sintetici, Cipermetrina e Tetrametrina, che conferiscono rispettivamente ottima persistenza e velocissima capacità letale.

CAMPI D'IMPIEGO

Per la lotta contro **insetti volanti** quali zanzare, zanzara tigre, mosche, vespe, tafani, chironomidi, dermestidi, punteruoli, simulidi, tignole, lasioderma e **striscianti** quali blatte, formiche, pesciolini d'argento, punteruoli, tribolii, termiti, contro pulci e zecche. Può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico, agglomerati urbani, aree suburbane, abitazioni, scuole ed asili, palestre, caserme, cinema, teatri, sale d'attesa di stazioni e aeroporti. Villaggi turistici, campeggi. Mense, alberghi, ristoranti. Ospedali, case di cura, case di riposo ecc. Magazzini e depositi di merci alimentari (in assenza di alimenti). Magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi. Ambienti industriali in genere. Zone ed attrezzature portuali. Mezzi di trasporto. Il prodotto può essere impiegato in giardini, prati, cespugli ornamentali, siepi e viali alberati per il controllo delle zanzare.

MODALITÀ E DOSI DI APPLICAZIONE

DEADYNA® si usa miscelato in acqua al momento dell'impiego e distribuito con pompe a pressione manuali o atomizzatori a motore in ragione di 1 litro per 10-15 mq. di superficie rispettando le seguenti dosi:

Insetti volanti Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione da distribuire sulle superfici (pareti, piani, persiane, ecc.). La dose maggiore è preferenzialmente indicata per il controllo delle mosche. Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d'acqua) sulle pareti esterne degli edifici, nei piazzali, sotto le siepi ed i cespugli, ecc. Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

Insetti striscianti Uso in ambienti interni: diluire in ragione dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d'acqua) a seconda dell'entità dell'infestazione e dell'insetto da combattere da distribuire sulle superfici, nelle crepe, sui battiscopa, ecc. La dose più alta è indicata per il trattamento delle blatte. Uso esterno: utilizzare la dose dello 0,5-1% (50-100 ml in 10 litri d'acqua) sulle pareti esterne degli edifici, sui marciapiedi, nei piazzali, ecc..

DEADYNA® può anche essere miscelata al 3-5% con solventi a base glicolica (300-500 ml in 10 litri di solvente) per impieghi con apparecchi a nebbie fredde o calde in ragione di 0,5-1 litro di soluzione per ettaro di superficie o 0,5-2 litri per 1.000 mc di ambiente.

Validità Il prodotto conservato a temperatura ambiente, nel contenitore originale, mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno 2 anni.

ATTENZIONE: la Ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possono derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

**DA NON VENDERSI SFUSO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**