

TIOSOL 80 WG (PFnPE)

Zolfo in formulazione granuli idrodispersibili

TIOSOL 80 WG Registrazione del Ministero della Salute n. 12048 del 28/06/2004

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Composizione:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 80
Coadiuvanti ed inerti q.b.a	g 100

Agrostulln GmbHWerksweg 2 – D-92551 Stulln (Germania)
Tel +49 (0)9435/3069-0

Taglie: g. 100-200-500

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.****PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.****REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.****CONSERVAZIONE: P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.****SMALTIMENTO: ---****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

Distribuito da:

Sipcam S.p.A. - Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI) - Tel. 0371 5961
Ital-Agro srl - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)
Tel. 0371 71090

Partita n.:

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Agrostulln GmbH, D-92551 Stulln Germania

Stabilimenti di confezionamento:

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)

SINAPACK Srl – Viale dell'Industria e Artigianato 7 – 27049 Stradella (PV)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**INFORMAZIONE MEDICHE****In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.****CARATTERISTICHE**

TIOSOL 80 WG è un fungicida di contatto a base di Zolfo ad attività preventiva e curativa nei confronti di tutte le forme di Oidio e Mal Bianco, con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggine, Corineo e di alcune specie di Acari, in particolare degli Eriofidi.

TIOSOL 80 WG si presenta in formulazione granuli idrodispersibili che si distingue per l'assenza di polveri e per la miglior adesività e uniformità di copertura della vegetazione nonché per la sicurezza e praticità d'impiego.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro di acqua irrorate con pompe a volume normale, impiegando la dose più bassa durante i periodi di più alta temperatura. Effettuare in ogni caso i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, evitando di trattare subito dopo una pioggia.

Vite*Trattamenti contro Oidio*

- Con bassa pressione di oidio: 300-400 g/hl
- Con alta pressione di oidio: 600-800 g/hl

Quando le epoche d'intervento coincidono con quelle contro la peronospora è possibile associare il prodotto ai fungicidi usati contro la Peronospora.

Trattamenti contro Eriofidi

ALLA RIPRESA VEGETATIVA INTERVENIRE CON 2-3 APPLICAZIONI ALLA DOSE DI 400-500 G/HL.

Pomacee: *Trattamenti contro Oidio*

- in prefioritura: 500-600 g/hl
- in post-fioritura: 200-300 g/hl

Drupacee: *Trattamenti contro Oidio*

- intervenire alla dose di 200-300 g/hl in trattamenti post-fiorali, dopo la scamicatura dei frutticini; 400-600 g/hl in pre-fioritura e post-raccolta.

Susino (*contro Ruggine*)

- in estate: 200 g/hl nelle ore più fresche

Nocciolo, Mandorlo: *Trattamenti contro Oidio*

- 200-400 g/hl in funzione del periodo e della pressione del patogeno.

Nocciolo (*contro Eriofide*)

inizio primavera: 300-500 g/hl

Agrumi: *Trattamenti contro Oidio*

- alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl

Olivio: *Trattamenti contro Oidio*

- alla comparsa dei primi sintomi: 250 g/hl

Ortaggi (in pieno campo ed in serra): *Trattamenti contro Oidio*

- alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl, in funzione della pressione del patogeno e della fase fenologica della coltura

Pomodoro (*contro Acaro Rugginoso*) alla comparsa dei primi acari: 250-400 g/hl. Ripetere il trattamento dopo 6-7 giorni**Patata:** *Trattamenti contro Oidio*

- preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 200-400 g/hl

Fragola: *Trattamenti contro Oidio*

- preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl

Cereali*Trattamenti contro Oidio*

- alla comparsa dei primi sintomi: 8 Kg/ha

Floreali e ornamentali: *Trattamenti contro Oidio*

- preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 150-400 g/hl

Rosa

trattamenti estivi: 100-200 g/hl

trattamenti invernali: 200-400 g/hl

Forestali: *Trattamenti contro Oidio*

- preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 300-400 g/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nella poltiglia a cui si vuole associare agitando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), Olii minerali, Captano, Diclofluanide ed inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

Mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap);**Pere** (Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio);**Vite** Sangiovese.

Può essere fitotossico, con temperature elevate, su Cucurbitacee.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta**ATTENZIONE****Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.****Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.****NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA****OPERARE IN ASSENZA DI VENTO****DA NON VENDERSI SFUSO****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**